

17

٥

Ep 2

$$b \quad m \quad E^x$$
$$\mathcal{L} \quad \mathcal{H} \psi \quad \mathcal{M} \neq \psi \quad = \quad \mathcal{E} \rho$$

'Ẽ ĭ HΨ η r 2 Ĝ 'Eρ ρ à% à ~ X à

Â

 $\hat{A}$

Б М Ё ^ γ Й І Ъ Ь І Ё Љ ~ Л
 H ψ M ≠ ψ G γ Ә Ğ V β H̃ ψ
 G γ v Ё ψ e Â ψ | H
 Ȯ | ψ H Ȯ O H ↓ ψ Â ψ H y ð h ~
 ψ 9 Ğ = vi ê Ё ï Ğ ê Ё ï τ Â Ъ ψ H

$$H_\psi \quad M \neq \psi \quad G \quad \gamma \quad \mathfrak{D} \quad \mathfrak{E} \quad \chi^\beta \quad H^\sim \psi$$
$$G \quad \gamma \quad \nu \quad \tilde{E} \quad \psi \quad e \quad \hat{A} \psi \quad | \quad H$$
$$O \sim \int \psi^\dagger H_O \psi \quad O = H_{\downarrow} \quad \psi^\dagger \hat{A} \psi \quad H = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + \frac{1}{2} \nabla \phi^2$$
$$\Psi_{\alpha} \otimes \xi = \sum_{\gamma \in \Gamma} e^{\gamma} E^{\tilde{\gamma}} \quad \text{with } \tilde{\gamma} = \hat{A} \cdot \gamma \in \Psi_H$$

= ' □ à ĩ à Â
`E ρ Â

б м `Ẽ

ℋ ψ

ℋ ℋ √ ℋ Ж